

پست الاطلاعاتی شماره ۵

■ راهنمای تغذیه با شیر مادر پس از سرگزین

■ تغذیه با شیر مادر اتفاقاً در حیاتی درین حرثان

طلسمای تندیپا شیر مادر پس از سفرگاهی

مادر عزیز

بارداری و تولد نوزاد از مهمترین و حساس‌ترین لحظات عمر هر انسانی محسوب می‌شود. کسب آگاهی و مهارت‌های لازم در دوران بارداری و پیش از زایمان در مورد نحوه زایمان ایمن و چگونگی مراقبت از نوزاد و تأمین نیازهای او ضامن بقاء و حفظ تندرسنی فرزند شماست. در این جا سعی ما بر این است که شما را به تغذیه شیرخوار با شیرمادر و زایمان طبیعی ترغیب نماییم. زیرا مادرانی که زایمان طبیعی می‌کنند را امر شیردهی و دادن آغوز به نوزاد و مراقبت از او موفق تر هستند. چون مادر بلافاصله بعد از زایمان نوزاد خود را در آغوش می‌گیرد و شیرمی‌دهد و در همان لحظات حساس ابتدای تولد رابطه عاطفی خود را با فرزندش برقرار می‌سازد. در حالی که سازارین یک عمل جراحی بزرگ است و نیاز به بیهوشی یا بی‌حسی موضعی دارد و می‌تواند علاوه بر خطرات جراحی، موجب تأخیر در شروع بموقع شیردهی و برقراری ارتباط با نوزاد شود، بنابراین برای حفظ سلامت مادر و نوزاد همیشه و در همه حال زایمان طبیعی توصیه می‌شود مگر در برخی شرایط که خانم باردار طبق نظر پزشک متخصص شرایط لازم را برای زایمان طبیعی نداشته باشد. در این صورت لازم است به توصیه پزشک سازارین شود.

خواه نوزاد با زایمان طبیعی و یا سازارین متولد شود، تغذیه او با شیرمادر بعنوان بهترین شروع، از اصول مشابهی پیروی می‌کند. در هر دو حالت اگر مادر قبل از زایمان آگاهی‌های لازم را کسب نماید و برنامه ریزی کند، بهترین شرایط شیردهی را برای خود فراهم می‌کند. در مواردی که سازارین اجتناب ناپذیر گردد باید با تمھیداتی مادر را برای شیردهی کمک کرد تا شیرخوار از این مائدۀ الهی در آغاز حیات خود محروم نشود و مادر و نوزاد هر دو از این نعمت بی‌همتای پروردگار بهره ببرند.

شیردهی مزایای بسیاری دارد از جمله موجب جمع شدن سریع تر رحم و تسريع بهبودی جسم و روان مادر پس از زایمان می‌گردد و مادر احساس توانمندی می‌کند، بعلاوه رابطه عاطفی نزدیک تری را بین مادر و نوزاد فراهم می‌کند.

برای حفظ تندرسنی خود و فرزندتان از طریق تغذیه با شیر مادر این مجموعه را به دقت بخوانید و به توصیه‌های آن عمل کنید و از کارکنان بهداشتی درمانی کمک بگیرید. پستان‌های شما طی دوران بارداری رشد کرده و آغوز تولید کرده‌اند و شما قادر به تولید شیر و تأمین تغذیه فرزندتان هستید. پس با قوت و قدرت او را شیردهیید، زیرا تغذیه با شیرمادر روش طبیعی تغذیه شیرخوار و برای مادر و کودک ضروری و حیاتی است.

و شما همکار محترم بهداشتی درمانی

شما که مراقبت از مادر و نوزاد را پس از زایمان بعهده دارید و یاور آنان در حساس ترین زمان هستید، مطالعه این مجموعه در یادآوری نکات مهم مراقبت‌ها و کمک‌های مورد نیاز مادر و نوزاد مفید است. گرچه تغذیه با شیرمادر فرآیندی ساده و طبیعی است، اما مادران نیاز به اطلاعات و حمایت دارند که چگونه آنرا به خوبی انجام دهند. سیاست‌های بیمارستان و رفتار کارکنان بهداشتی درمانی تأثیر بیشتری بر مادران سزارین شده به دلیل اقامت طولانی تر آنان در بیمارستان دارد. هفتنه اول پس از تولد برای مادر و نوزاد زمان حساسی است و نزدیکان و اطرافیان مادر و کودک بویژه در این ایام باید از تغذیه با شیرمادر حمایت کنند. بی تردید مادران با پشتونه دانش، مهارت‌ها و حمایت‌های شما می‌توانند شیردهی موفقی را شروع نموده و ادامه دهند.



نیازهای نوزاد

نوزاد بلا فاصله پس از تولد نیاز به تماس فوری با مادر دارد. او نیازمند شنیدن صدای مادر، دیدن و بوئیدن او و آغوش گرم مادر است تا تنها نباشد و احساس غربت نکند. او نیاز دارد که حضور پدر و سایر اعضاء، خانواده را حس کند. نوع بیهوشی مادر بر مراتب مجال او برای تماس با نوزاد و شروع شیردهی تأثیر دارد. اگر شما مادر گرامی بلا فاصله پس از زایمان هشیار باشید به نفع نوزاد است و اگر سزارین با بی حسی موضعی (نخاعی) انجام شود، بر بیهوشی عمومی ارجح است. زیرا هنگام تولد نوزاد می‌توانید بیدار و هشیار باشید و او را در آغوش بگیرید و شیر بدھید. این امر به تسریع پیوند عاطفی بین مادر و نوزاد، برقارای جریان شیر، جلوگیری از گریه و زجر تنها ای و جدایی نوزاد و جلوگیری از کاهش درجه حرارت نوزاد کمک می‌کند. در صورت انجام عمل جراحی با بیهوشی عمومی به محض اینکه توان پاسخگویی داشته باشد، کارکنان می‌توانند نوزاد را با حضور خود در تماس با شما بگذارند. در مدت انتظار برای بازگشت مادر از اتاق عمل، کارکنان می‌توانند نوزاد را به منظور گرم نگه داشتن و آرام کردن تحت نظر پرسنل آگاه در تماس پوست با پوست با پدر یا سایر اعضاء، خانواده قرار دهند.

نوزاد نیازمند تغذیه با شیرمادر است: شیرمادر غذایی بی نظیر و بدون جایگزین برای شیرخوار است که جسم و جان او را تغذیه می‌نماید.





مشکلات احتمالی مادر سزارین شده



- مادر سزارین شده با مشکلات احتمالی جسمی و روانی مواجه می شود که عبارتنداز:
- بیهوشی و عدم هشیاری در مراحل اولیه، یعنی زمانی که تماس مادر با نوزاد و شیردهی لازم است. (چنانچه سزارین از طریق بیهوشی عمومی نباشد این مشکلات کمتر است.)
- درد و تأثیر آن بر مادر که می تواند بر توانایی او برای مراقبت از شیرخوار اثر بگذارد و سبب کاهش تولید شیر شود و جریان یافتن شیر(رگ کردن پستان) را مختل نماید.
- ترس از عمل، طولانی شدن مرحله درد زایمان، وصل کردن سرم، گذاشتن سوندمثانه، اجبار به خوابیدن در بستر و آزاد نبودن، ممنوعیت مصرف غذا قبل و بعد از عمل جراحی و کاهش انرژی برای مراقبت از شیرخوار، خطر عفونت، خونریزی، احساس شکست که بدن نتوانسته بطور طبیعی عمل کند، از سایر مشکلات احتمالی هستند.



سزارین مانع شیردهی موفق نمی گردد. مشکلات به زمان شروع و دفعات شیردهی مربوط می شود. پس شیردهی را باید هرچه زودتر آغاز نموده و بطور مکرر ادامه دهید.

مشکلات احتمالی نوزاد متولد شده به روش سزارین:



- نوزادی که به روش سزارین متولد می شود نیز ممکن است با مشکلاتی مواجه شود که عبارتنداز:

- اثر داروهای بیهوشی، استرس جدایی از مادر، فشرده نشدن قفسه سینه حین زایمان و در نتیجه مشکلات ریوی و تنفسی، نارس به دنیا آمدن، تأخیر در تماس با مادر، کاهش دفعات شیردهی به دلیل مشکلات مادر.



توصیه‌های تغذیه‌ای شیرخوار

- ۱- شیر روزهای اول که آگوز نام دارد حاوی مواد بسیار مغذی بوده و به عنوان اولین واکسن نوزاد برای پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری‌ها تلقی می‌شود. پس تغذیه نوزاد با آگوز ضروری و حیاتی است. مقدار آن کم است و بتدریج زیاد می‌شود.
- ۲- شیر مادر حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز شیرخوار است. کودک را در ۶ ماه اول تولد به طور انصصاری (فقط) با شیر مادر تغذیه کنید. بدین معنی که از دادن آب، آب قند، شیر مصنوعی و سایر مایعات و غذاها در ۶ ماه اول به شیرخوار بپرهیزید.
- ۳- غذای کمکی را پس از ۶ ماهگی (۱۸۰ روزگی) شروع کنید و شیر مادر را تا پایان ۲ سالگی یا بیشتر همراه با غذا ادامه دهید.
- ۴- شیرخوار را مکرر در هر زمانی که نیاز دارد، به پستان بگذارید تا تولید شیر زیاد شود. وقتی جریان شیر بقرار شد، معمولاً شیرخوار ۱۰-۱۲ بار در شبانه روز شیر می‌خورد و ممکن است بعضی روزها بیشتر هم نیازداشته باشد.
- ۵- مهمترین عامل در افزایش شیر مادر، مکیدن مکرر و تخلیه مرتب پستان‌ها بر حسب میل و تقاضای شیرخوار در شب و روز است. شیر را نه بر حسب ساعت بلکه به میل و دلخواه شیرخوار به او بدهید.
- ۶- از به کاربردن پستانک و شیشه شیر که سبب کاهش میل مکیدن پستان توسط شیرخوار و در نتیجه کاهش شیر مادر، انتقال آلودگی، عفونت و بیماری، تغییر فرم دندان‌ها و قالب فک شیرخوار و اختلال در مکیدن می‌شود، جدا پرهیز نمایید.
- ۷- با شیرخوار خود در یک اتاق باشید و در کنار یکدیگر بخوابید. هم اتاقی مادر و نوزاد برای مادر سازارین شده دارای مزایای بسیاری است.
- ۸- در صورت جدایی مادر و شیرخوار به هر علتی و عدم امکان تغذیه مستقیم از پستان، شیر خود را دوشیده و آنرا به کمک فنجان به شیرخوار بدهید.
- ۹- در صورت بروز مشکلات پستانی مثل زخم و شفاق نوک پستان که معمولاً به دلیل پستان گرفتن نادرست توسط شیرخوار است، ضمن ادامه شیردهی مراجعته به مراکز بهداشتی درمانی لازم است.



اقدامات لازم

مادر پس از سازارین برای شیردهی نیاز به کمک های زیر توسط کارکنان بهداشتی درمانی دارد:

- ۱- کمک به تماس پوست با پوست مادر و نوزاد به محض توان مادر برای پاسخ گویی
- ۲- کمک برای در آگوش گرفتن شیرخوار در وضعیت راحت و بدون درد برای مادر
- ۳- کمک برای به پستان گذاشتن شیرخوار به محض آمادگی او

در هر یک از این موارد به نکات زیر توجه کنید:

۱- تماس مادر و نوزاد

■ اگر مادر بیهوش بود، به محض رفع بیهوشی و توان مادر، هم اتفاقی مادر و نوزاد با کمک همراه و تلاش برای تماس بیشتر پوست با پوست مادر و نوزاد و جدانکردن نوزاد سالم با علائم حیاتی ثابت از مادر ضروری است. هم اتفاقی ۲۴ ساعته مزایای بسیاری دارد از جمله به برقراری شیردهی کمک می کند.

■ تازمان به هوش آمدن مادر، تماس پوست با پوست نوزاد با پدر یا سایر اعضاء، خانواده تحت نظر کارکنان بهداشتی درمانی را می توان برقرار نمود.

■ نوزاد نارس اما سالم و با علائم حیاتی ثابت را نیز می توان در تماس پوست با پوست با مادر قرار داد.

■ داشتن همراه که به مادر و نوزاد و استراحت مادر کمک کند، لازم است.

■ مادرانی که بابی حسی موضعی (نخاعی) زایمان نموده و هشیار هستند مثل زایمان طبیعی به تماس پوست با پوست با نوزاد تشویق شوند.

■ اگر مادر تپ کند که معمولاً به دلیل عفونت محل عمل یا مثانه است، نباید نوزاد از مادر جدا شود بلکه آنها باید ۲۴ ساعته در کنار هم باشند. مادر درمان های لازم را دریافت کند و دست مادر تمیز باشد.

مزایای هم اتاقی مادر و نوزاد:

اگل بنوزاد خواب آسود است و وقتی مادر و نوزاد با هم هستند، مادر در مورد دوره خواب و بیداری او آگاه تر می شود و تغذیه اورا در هشیارترین زمان و وقتی که شیرخوار آماده شیرخوردن است، انجام می دهد. اگر نوزاد زیاد می خوابد مادر حداقل هر ۲-۳ ساعت او را تشویق به شیرخوردن می کند. مادر می تواند مطمئن باشد که کسی به او شیشه شیر نمی دهد. مهمترین مزایای آن تأمین آغوز است. تغذیه نامحدود در وضعیت صحیح در روزهای اول از زخم شدن نوک پستان و احتقان پیشگیری می کند. همچنین ممکن است نوزاد علائم گرسنگی را نشان دهد و اگر به او توجه نشود به خواب می رود لذا به علائم زودرس گرسنگی توجه کنید.

همه مادران با تماس پوست با پوست با نوزاد شان بلا فاصله پس از زایمان و در غالب اوقات می توانند تولید شیرشان را حفظ کنند.

۲- قرارگرفتن در وضعیت راحت برای شیردهی

- خوابیدن مادر روی تختی که کناره های آن نزد داشته باشد بهتر است تا او بتواند با گرفتن نزد راحت و بدون فشار به بخیه ها بچرخد.
- اگر ممکن است سرم به قسمت قدام ساعد مادر وصل شده و خوب ثابت شود تا بتواند راحت تر نوزاد را بغل کند.
- مادر در وضعیت های مختلف زیر می تواند راحت باشد:

۱- مادر به یک پهلو بچرخد و در جلوی شکم خود پتو یا بالش قرار دهد، گذاشتن بالش در پشت مادر برای تکیه کردن و نیز بین پاهای او برای کاهش کشیدگی محل بخیه ها مفید است. خم کردن پاهای بطرف شکم به کاهش فشار روی بخیه ها و کاهش درد کمک می کند. در حالتی که مادر به پهلو خوابیده و هشیار است، برای دادن پستان بالایی زیر نوزاد بالش قرار دهید تا به سطح پستان بالایی برسد و سپس برای تغذیه از پستان زیرین بالش را بردارید. وقتی درد مادر کمتر است، می تواند نوزاد را روی سینه خود نگهدارد و با او غلت بزند.

۲- مادر خوابیده به پشت بطوری که شیرخوار روی شکم و سینه مادر قرار بگیرد.
۳- سروته شیرخوار در بالای بدن مادر بطرف پستان و پاهای بطرف خارج بدن قرار بگیرد.

۴- مادر در حالت نشسته است و روی بخیه‌ها بالش قرار داده و شیرخوار را روی بالش می‌گذارد. در این حالت مادر پاهایش را خم کرده و زیرزانو متکامی گذاشت تا محل بخیه‌ها کشیده نشود.

۵- مادر در حالت نشسته است و شیرخوار را در زیر بغل نگه می‌دارد.

۶- مادر روی صندلی پایه کوتاه بنشیند یا از هر صندلی که موجود است استفاده کند اما زیر پایش چهارپایه بگذارد. بطوریکه فاصله بین زانو و لگن او افقی باشد و روی پاهای خود نیز بالش گذاشته و شیرخوار را بالا بیاورد.

۷- شیرخوار می‌تواند در عرض قفسه سینه مادر قرار بگیرد. (گهواره‌ای متقاطع)

۸- اگر مادر بی‌حسی نخاعی شده، شیر دادن در حالت درازکش برای جلوگیری از بروز سردرد او مناسب است.

۳- به پستان گذاشتن نوزاد

- به محض نشان دادن علائم آمادگی و گرسنگی در نوزاد باید او را به پستان گذاشت.
- مادر باید با نوک پستان اطراف دهان نوزاد را المس کند تا او تحریک شده و پستان را بگیرد. حس بویایی نوزاد او را علاقمند می‌کند تا پستان مادر را بگیرد.
- باید مراقب بود که نوزاد دهانش را خوب باز کند تا بتواند نوک و هاله اطراف آنرا بقدر کافی در دهان بگیرد.

مزایای زود شروع کردن تغذیه با شیر مادر پس از تولد:

تغذیه نوزاد با شیر مادر طی ساعت اول پس از تولد، مادر و نوزاد را از نظر عاطفی به هم نزدیکتر می‌کند. باعث ترشح هormون‌ها برای انقباض سریع تر رحم و برگشت آن به حالت اول و کاهش خونریزی می‌شود و پستان‌های مادر را برای زودتر شیردادن تحریک می‌کند. اما مزیت دیگر آن برای مادر سزاوینی که بی‌حسی نخاعی شده این است که تا مدتی که بی‌حسی موضعی او برطرف نشده، او راحت و بدون درد است و این فرصت مناسبی برای لذت بردن از اولین تغذیه شیرخوار بدون درد و ناراحتی است. بعلاوه چون مکیدن نوزاد در ساعت اول تولد معمولاً بسیار قوی است، برای نوزاد هم این مزیت را دارد که بخاطر تمایل طبیعی به تغذیه با شیر مادر، شروع خوبی را تجربه می‌کند و آغاز را دریافت می‌نماید که باعث محافظت اور برابر بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.

۴- توجه به برخی نکات مهم

صرف دارو

■ استفاده از مسکن برای کاهش درد مادر توصیه می‌شود. بهتر است مسکن بلا فاصله پس از شیردهی صرف شود تا حداکثر مقدار ظهور آن در شیر مقارن با شیردهی بعدی نباشد، مسکن فقط در ۴۸-۷۲ ساعت اول یا تا زمان به شیرآمدن لازم است، برای صرف مسکن مناسب با پزشک مشورت کنید.

- برای مادر از داورهایی استفاده شود که برای نوزاد ضرر نداشته باشد.
- اگر نوزاد خواب آلود است، ضمن علت یابی و رفع آن به شیرخوردن نوزاد هم توجه شود.

توجه به علائم گرسنگی و سیری نوزاد

علائم گرسنگی عبارتند از:

- حرکات چشم‌ها و افزایش آنها
- بازکردن دهان
- بیرون آوردن زبان
- حرکت سر
- صدای‌های ظریف
- مکیدن دست و پتو یا ملحفه (یا هر چه که در تماس با دهان او قرار گیرد)
- علائم دیررس شامل گریه و قوس زدن است. لذا اجازه ندهید گرسنگی وارد این مرحله شود.
- عده‌ای بیدار شده و منتظر می‌مانند و اگر به آنها توجه نشود، به خواب می‌روند و عده‌ای آزده خاطر می‌شوند.



علائم سیری عبارتند از:

■ وقتی شیرخوار سیر شود شل و راحت شده و پستان را رها می کند.

در نوزاد رسیده:

مکیدن بیش از ۴۰ دقیقه در اکثر دفعات، یا کمتر از ۱۰ دقیقه در اکثر دفعات، بیش از ۱۲ بار در اکثر روزها (پس از به شیرآمدن مادر) ممکن است ناشی از نادرست گرفتن پستان باشد، وضعیت پستان گرفتن شیرخوار را باید کنترل کرد.

توجه به نشانه های پستان گرفتن صحیح توسط شیرخوار

وقتی شیرخوار به طرز صحیح پستان را گرفته باشد، شما علائم زیر را مشاهده می کنید:

- ۱- دهان شیرخوار کاملاً باز است.

- ۲- نوک و قسمت بیشتری از هاله پستان در دهان شیرخوار قرار دارد.

- ۳- لب پائین او به بیرون برگشته است.

- ۴- چانه شیرخوار به پستان مادر چسبیده است.

اجازه دهید شیرخوار خودش پستان را رها کند سپس پستان دیگر را به او بدهید. در وعده بعد شیردهی را از پستانی شروع کنید که شیرخوار در وعده قبل شیرکمتری از آن خورده یا اصلاً نخورده است.

نکته مهم: چون ممکن است در زایمان با بی حس اپیدورال، آرئول (هاله قهوه ای پستان) دچار تورم ناشی از دریافت سرم شده باشد و نوزاد نتواند پستان را درست بگیرد، باید با اقداماتی این تورم را کاهش دهند. مثلاً آرئول را از نزدیک نوک پستان با انگشتان حدود یک دقیقه بطرف قفسه سینه فشار دهند یا «شکل دهنده نوک پستان» را به مدت ۲۰ دقیقه قبل از شیردادن داخل سینه بند روی پستان بگذارند.

نشانه های مکیدن مؤثر

- ۱- مکیدن ها آهسته، عمیق و گاه با مکث است.
- ۲- شما می توانید بلعیدن شیر را مشاهده کنید یا صدای قورت دادن او را بشنوید.
- ۳- در هنگام شیرخوردن گونه های شیرخوار برجسته است و به داخل کشیده نمی شود.
- ۴- شیرخوار خودش شیرخوردن را خاتمه می دهد و پستان را رها می کند و راضی به نظر می رسد.

شایعترین عواملی که تولید شیر مادر را کم می کنند


چنانچه پستان تخلیه نشود، شیر کمتری تولید می شود که می تواند به علل زیر باشد:

- ۱- تغذیه نامکرر
- ۲- تغذیه بر حسب جدول زمان بندی
- ۳- رفعتات کوتاه مدت تغذیه
- ۴- پستان گرفتن نادرست و مکیدن ضعیف
- ۵- بغل کردن نادرست شیرخوار موقع شیردادن که نتواند پستان را درست بگیرد.

دوشیدن شیر

■ اگر نوزاد قادر به مکیدن نیست دوشیدن شیر باید زودتر یعنی ظرف ۶ ساعت اول یا روز اول شروع شود. بطوریکه مادر در ساعات بیداری هر ۳ ساعت شیرش را بدوشد تا شیر جریان یابد و از بروز احتقان پیشگیری شود. اگر شیرخوار فعلاً نباید شیر بخورد شیر دوشیده شده را برای مصارف بعدی او ذخیره کنید. جمع آوری آغوز برای تغذیه شیرخوار بسیار ارزشمند است.

■ اگر مادر به دلیل بیماری بستری شده است، لازم است فردی ماهر برای دوشیدن پستان به مادر کمک کند. مادر باید دوشیدن با دست را بیاموزد. در صورت دسترسی، استفاده از شیردوش برقی مؤثر است.





- نحوه دوشیدن شیر با دست و چگونگی تحریک به جریان انداختن شیر، نگهداری شیر دوشیده شده و تغذیه شیرخوار با آنرا از کارکنان بهداشتی درمانی بیاموزید.

سایر کمک‌های لازم به مادر

- مادران برای ایجاد و تحکیم اعتماد بنفس خود به کمک کارکنان بهداشتی درمانی و اعضاء خانواده نیاز دارند.
- مادران نیاز به استراحت کافی در بیمارستان و منزل و کمک افراد خانواده در کارهای منزل دارند تا بتوانند بیشتر در اختیار شیرخوار باشند.
- در منزل برای جلوگیری از حرکت زیاد مادر، باید امکانات لازم در کنار و در دسترس او قرار گیرد.

مادر نیاز به استراحت فراوان، مصرف غذا و مایعات کافی دارد. مادر با اعتماد به توانایی خود و با کمک و حمایت اطراحیان شیردهی موفقی خواهد داشت.

آرزوی ما سلامت و سعادت شما و فرزند دل‌بندتان است.

شیردهی را تا پایان دو سالگی ادامه دهید.

فراموش نکنید بهترین شیرکمکی یا جایگزین شیرمادر در صورت لزوم، شیر مادران سالم دیگر (شیر دایه) است.



تغذیه با شیر مادر، مطلوب ترین و ایمن ترین روش تغذیه شیر خواران حتی در بحران هاست.



تغذیه با شیر مادر اثای حیاتی در بحران

بحران یک وضعیت غیرعادی است که سلامت و بقا، جمعیت را در معرض خطر قرار می‌دهد. بحران‌ها ممکن است ساخته بشر باشند یا به طور طبیعی و بی‌خبر، مرتبًا یا در دوره‌های پری و طولانی، در هر جای دنیا رخ دهند و اعم از سیل، طوفان، زلزله، جنگ، کمبود غذا تا همه گیری بیماری‌ها.... همگی وضعیت عادی زندگی را تخریب می‌کنند و دارای ویژگی‌های مشابهی هستند که با اضطراب، عدم امنیت، نبود تسهیلات بهداشتی و کمبود ذخیر آب سالم، غذا، سوخت، مراقبت‌های پزشکی و پناهگاه توصیف می‌شوند.

■ برای کودکان و بخصوص آنها که با شیر مادر تغذیه می‌شوند، به خطرافتادن تغذیه با شیر مادر یک بحران اساسی محسوب می‌شود.

■ میزان مرگ و میر شیرخواران زیر یک سال در بحران‌ها بسیار بیشتر از موقع عادی و در دامنه ۱۲-۵۲ درصد گزارش شده است.

■ حمایت از تغذیه با شیر مادر، از مهمترین مداخلات حفظ حیات است و اثر حفاظتی آن برای خردسال ترین شیرخواران در بالاترین حد است. بطوری که یک پنجم از مرگ‌های نوزادان را می‌توان با شروع زودرس تغذیه انحصاری با شیر مادر (ظرف ساعت اول تولد) بیشگیری نمود.

■ حتی در شرایط غیربحران، روش‌های مطلوب تغذیه شیرخوار می‌تواند به معنی تفاوت بین مرگ و زندگی باشد. بطوری که شیرخواران کمتر از ۲ ماه محروم از شیر مادر احتمال مرگشان ۶ برابر بیشتر است.

■ در شرایط بحران و امدادرسانی، تغذیه با شیر مادر یک سپر حفاظتی برای شیرخواران است.

■ شیر مادر یک منبع غذایی سالم و ایمن برای شیرخواران است که بطور آنی قابل دسترس بوده و حفاظت فعال در برابر بیماری‌ها را فراهم نموده و شیرخوار را گرم و نزدیک مادر نگه می‌دارد. حفظ، حمایت و ترویج تغذیه زودرس و انحصاری با شیر مادر در ۶ ماه اول عمر، و تداوم تغذیه با شیر مادر همراه با عرضه غذاهای کمکی مناسب و سالم تا ۲ سالگی یا بیشتر، حفاظت مطلوبی را در برابر خطرات محیطی فراهم می‌کند.

آمادگی در برابر بحران، امری حیاتی است. حمایت از تغذیه با شیر مادر در موقعیت عادی و غیربحرانی، توانایی مادران را برای مقابله در شرایط بحران تقویت می‌کند.



تغذیه مصنوعی: پر خطر برای تمام شیرخواران

■ شیر مصنوعی مصونیت و ایمنی به شیرخواران عرضه نمی کند و به مکانیسم دفاعی روده شیرخواران آسیب می رساند، به ویژه بروز عفونت ها را تسهیل می کند.

■ منابع اساسی مورد نیاز تغذیه مصنوعی مثل آب تمیز و سوخت در شرایط بحران کمیاب هستند. بعلاوه خطرات تغذیه مصنوعی بستگی به کیفیت و کفایت ذخایر شیر مصنوعی، الودگی ذاتی شیر مصنوعی و مشکلات تمیزکردن شیشه و سرشیشه ها دارد. شرایط حمل و نقل و ذخیره کردن جانشین شونده های شیرمادر نیز بر مشکلات موجود می افزاید.

■ جانشین شونده های شیرمادر که به عنوان کمک های بشردوستانه اهدا می شوند، علاوه بر کاهش اعتماد به نفس مادران شیرده، اغلب در بازار محلی به فروش می رسند و اثرات منفی بر روش های تغذیه شیرخواران در جامعه میزبان که آوارگان را پناه داده اند، بر جای می گذارند.

فراهرم کردن غذا برای مادران شیرخواران (زیر یک سال) و تشویق آنان به تغذیه فرزندان شان با شیرمادر ارجح است. تغذیه شیرخواران با شیرمادر به آنان آرامش، انواع پادتن و حفاظت در برابر بیماری ها را اهدا می کند.

چه پاسخی به بحران مورد نیاز است؟



تغذیه با شیرمادر در شرایط بحران اغلب به دلایل زیر تضعیف می شود:

۱- فقدان آکاهی در مورد تغذیه با شیرمادر:

باورهای غلط نظری: خشک شدن شیرمادر در اثر اضطراب، یا عدم توانایی مادران سو، تغذیه ای برای شیردهی رایج است. بسیاری از مردم نمی دانند که مادران می توانند تولید شیرشان را افزایش دهند، یا شیردهی خود را پس از قطع آن مجدد برقرار کنند.

۲- فقدان حمایت و حفاظت فعل از تغذیه با شیرمادر: منظور از چنین حفاظت و حمایتی، اطمینان یافتن از حفظ امنیت مادران و اولویت دسترسی آنان به غذا، آب، پناهگاه و در صورت نیاز وجود مکان خصوصی برای تغذیه شیرخوار با شیرمادر است. حفاظت به معنی اقدام برای پیشگیری از اهدا، بی رویه و بدون کنترل شیرمصنوعی و محصولات شیری، شیشه، سرشیشه و گول زنک، تأکید بر ارزش تغذیه با شیرمادر به منظور پیشگیری و ضدیت با پیام های حاوی باورهای نادرست از رسانه ها است.

۳- اهدا شیر مصنوعی (شیر خشک) و بطری های شیر: این محصولات در بحران ها بطور مکرر برای تمام مادران اهدا، و توزیع می شوند و موجب تضعیف شیردهی آنان و در

نتیجه بیماری و مرگ کودکان می‌گردد. گروه‌ها و برنامه‌های حمایت از تغذیه با شیرمادر که کمک‌های شیردهی را با مهارت عرضه می‌کنند، مورد نیاز هستند.

برای به حداقل رساندن خطرات بیماری‌ها، پیگیری روش‌های زیر حیاتی است:

- ۱- استفاده از شیردایه می‌تواند یک انتخاب مناسب برای تغذیه شیرخوار بعنوان یک راه حل موقت و یا برای شیرخوار یتیم و بدون مادر باشد.
- ۲- اهدا شیر مصنوعی و سایر غذاهای کودک، بطری و سرشیشه (پستانک) باید کنترل شوند.
- ۳- محصولاتی که علیرغم عدم درخواست، اهدا می‌شوند، باید توسط سازمان مسئول تغذیه شیرخواران به طور متمرکز و یک جا ذخیره شوند و توسط کارکنان بهداشتی توزیع شوند.
- ۴- جانشین‌شونده‌های شیرمادر باید فقط به شیرخوارانی که واقعاً نیازمند آن هستند، (بشرح زیر) داده شود.
- ۵- دسترسی به ذخایر جانشین‌شونده‌های شیرمادر باید تا زمانی که شیرخوار به آن نیاز دارد، تداوم یابد. (حداقل تا ۶ ماهگی و حدکثر تا یک سالگی یا تا زمانی که تغذیه با شیرمادر دوباره برقرار شود).
- ۶- این محصولات برای ترویج یک نام تجاری خاص مورد استفاده قرار نگیرند.
- ۷- جانشین‌شونده‌های شیرمادر هرگز نباید بخشی از توزیع عمومی غذا باشند.
- ۸- هرگز نباید بطری و سرشیشه برای تغذیه شیرخواران توزیع نمایند. مصرف آنها باید منع شود و تغذیه شیرخوار با فنجان را ترویج نمایند.

تعیین شیرخواران نیازمند به تغذیه با جانشین‌شونده‌های شیرمادر:



در اقدامات امدادی بحران، تغذیه با شیرمادر یادایه باید حفظ، حمایت و ترویج شود. جانشین‌شونده‌های شیرمادر باید فقط به استفاده در شرایط زیر محدود شوند:

- ۱- شیرخوار دسترسی به شیرمادر نداشته باشد (مثل فوت یا بیماری جدی مادر یا عدم توانایی موقت او برای شیردهی، عدم حضور طولانی مدت مادر هنگامی که دسترسی به شیر دایه یا سایر منابع شیرمادر وجود نداشته باشد. چون در این صورت استفاده از شیردایه ارجح است).
- ۲- شیرخوار قبل از بحران منحصر با جانشین‌شونده شیرمادر تغذیه شده باشد.

در طول بحران، مادران نیازمند حمایت فعال برای تداوم شیردهی یا برقراری مجدد آن هستند.

مراقبت از کودکان یتیم و بی سرپرست

- ۱- برای کودکانی که مادران شان را از دست داده اند، محل مشخصی (شامل خانه یا چادر) تخصیص دهید تا بتوانند از مراقبت های لازم در آن جا بهره مند شوند.
- ۲- یک کارمند بهداشتی را عهده دار مراقبت از کودکان در آن محل کنید.
- ۳- مطمئن شوید که در آن محل جانشین شونده شیرمادر تحت نظارت به مصرف می رسد.
- ۴- نحوه تغذیه شیرخواران با فنچان توسط مراقبت کنندگان را مشاهده کنید.

حمایت از تغذیه اکثریت شیرخواران با شیر مادر

- ۱- زنانی که قبل از بحران فرزندشان را با شیر خود تغذیه کرده اند، در شرایط بحران هم در صورت برخورداری از حمایت، قادر به تداوم شیردهی خواهند بود.
- ۲- زنان شیرده را تغذیه کنید. آب و غذا در اختیار آنان بگذارید.
- ۳- برای برقراری مجدد شیردهی از زنانی که شیردهی خود را در طول بحران متوقف کرده اند، هر چه سریع تر و به محض امکان حمایت کنید.
- ۴- مادرانی را که پس از بحران زایمان می کنند، برای شروع تغذیه انتشاری نوزادشان با شیرمادر تشویق و حمایت کنید.

به افزایش آگاهی ها کمک کرده و سعی کنید تا به مشکل تغذیه شیرخواران در بحران ها، پاسخ مناسب داده شود. اهمیت حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر را در شرایط بحران مورد تأکید قرار دهید.

همه می توانیم به ایجاد محیط مناسبی برای مادران و کودکان کمک کنیم.