





آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در کشور

تا تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۵

گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماریهای حاد تنفسی، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر



بر اساس داده های نظام مراقبت دیده وری تنفسی دو پاتوژن (آنفلوانزا و کووید-۱۹)



در هفته دوم آذرماه ۱۴۰۴

(برابر با هفته سی و هفتم سال جاری):

- نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی در مراجعین سرپایی، افزایش یافته؛ به طوری که ۱۶/۲ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) بوده اند. لیکن در مراجعین بستری کاهش مختصری مشاهده می شود، به طوریکه ۱۶/۲ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.



- در این نظام مراقبت دیده وری، از میان ۳۴۶ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۳۴/۱ % و درصد مثبت آزمایش PCR کووید-۱۹، کمتر از ۱% (۰/۲%) بوده است.

در این هفته:

- نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، قدری کاهش نشان داده و در بیماران بستری به حدود چهار برابر آستانه هشدار بالا رسیده است. لازم به ذکر است که تایپ و ساب تایپ غالب به ترتیب "A" و "H3N2" بوده است.
- نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ همچنان در سطح پایینی قرار داشته و در مقایسه با هفته قبل، کاهش داشته است.
- لازم به ذکر است باتوجه به آنکه زمان آغاز موج در استان های واقع در اقلیم های آب وهوایی مختلف کشور تفاوت دارد، تفسیر کاهش مشاهده شده در این هفته نسبت به هفته قبل باید با احتیاط تفسیر شود.




آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در کشور

تا تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۵


گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماریهای حاد تنفسی، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

مقایسه روند هفتگی آنفلوانزا در کشور سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴ (بر اساس نظام مراقبت غیردیده وری آزمایشگاهی)



- در هفته میلادی گذشته (۳ آذر لغایت ۱۰ آذر ۱۴۰۴)، بر اساس آخرین گزارش هفتگی نظام مراقبت آزمایشگاهی آنفلوانزا (غیردیده وری)- از میان ۳۴۹۱ نمونه آزمایش شده (به روش PCR) در آزمایشگاه مرجع ملی آنفلوانزا و ۱۷ قطب منطقه ای تابعه، ۳۳/۲٪ موارد از نظر آنفلوانزا مثبت بوده و ۸۷/۶٪ موارد آنفلوانزای تایپ A را نیز ساب تایپ "H۳N۲" تشکیل داده است.
- استانهای خراسان جنوبی، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اصفهان، تهران، کرمانشاه و همدان، درصد آنفلوانزای بالاتری را در مقایسه با متوسط کشوری دارند.
- در هفته اخیر نسبت مثبت بودن آنفلوانزا در استان آذربایجان غربی نیز از آستانه هشدار بالا عبور کرد.

بر اساس نتایج آزمایشات نمونههای اخذ شده با هدف دیده وری ۲۱ پاتوژن تنفسی



در نیمه اول آذر ماه سال جاری؛

- در ۹۰ نمونه اخذ شده در این دیده وری، که همگی مربوط به استان تهران بوده است:
- آنفلوانزا با نسبت ۲۸/۹ درصد نمونههای بررسی شده، **شایعترین** پاتوژن تنفسی در گردش بود؛
- رینوویروس با ۱۶/۷٪ و سایر کرونا ویروس ها (به جز کووید-۱۹) با ۷/۸٪ در رتبه های بعدی قرار داشتند.

دانشگاه ها و مراکز همکار دیده وری



کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر گزارش ها در وبسایت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت

www.icdc.behdasht.gov.ir