





آخرین وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در کشور

تا تاریخ ۱۴۰۴/۹/۲۲



گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماریهای حاد تنفسی، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

بر اساس داده های نظام مراقبت دیده وری تنفسی دو پاتورن (آنفلوانزا و کووید-۱۹)



در هفته سوم آذرماه ۱۴۰۴
(برابر با هفته سی و هشتم سال جاری):

- نسبت موارد دارای علائم عفونت های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری، کاهش یافته؛ به طوری که **۱۴/۷ درصد** از مراجعین **سرپایی**، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و **۱۴ درصد** از مراجعین **بستری**، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.




- در این نظام مراقبت دیده‌وری، از میان ۲۹۷ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد **مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۲۸/۶٪** و درصد **مثبت آزمایش PCR کووید-۱۹، کمتر از ۱٪ (۰/۶٪)** بوده است.

در این هفته:

- نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، قدری کاهش نشان داده، لیکن در بیماران بستری همچنان نزدیک به چهار برابر آستانه هشدار بالا قرار دارد. لازم به ذکر است که: تایپ و ساب تایپ غالب به ترتیب "A" و "H3N2" بوده است.
- نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر **کووید-۱۹** همچنان در سطح پایینی قرار داشته و در مقایسه با هفته قبل، اندکی افزایش داشته است.

گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماریهای حاد تنفسی، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر




مقایسه روند هفتگی آنفلوانزا در کشور سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴ (بر اساس نظام مراقبت غیردیده وری آزمایشگاهی)




- در هفته میلادی گذشته (۱۰ آذر لغایت ۱۶ آذر ۱۴۰۴)، که یک هفته از گزارش دیده وری عقب می باشد، بر اساس آخرین یافته های هفتگی نظام مراقبت روتین آزمایشگاهی آنفلوانزا (غیر دیده وری)- از میان ۴۸۱۶ نمونه آزمایش شده (به روش PCR) در آزمایشگاه مرجع ملی آنفلوانزا و ۱۷ قطب منطقه ای تابعه، **۳۴/۴٪** موارد از نظر **آنفلوانزا مثبت** بوده ؛ و ۷۹/۶٪ موارد آنفلوانزای تایپ A را ساب تایپ "H۳N۲" تشکیل داده است.
- استانهای گلستان، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اصفهان، اهواز، تهران، کرمانشاه و همدان، درصد آنفلوانزای بالاتری را در مقایسه با متوسط کشوری دارند.

مقایسه تغییرات دانشگاهی درصد آنفلوانزا مثبت در سه هفته اول آذر ۱۴۰۴ (بر اساس داده های غیردیده وری آزمایشگاهی)

در این گزارش، نمای جغرافیایی وضعیت آنفلوانزا در کشور در هفته های اول تا سوم آذر ماه اضافه شده است. این نقشه ها توزیع درصد مثبت شدن آنفلوانزا را در میان موارد عفونت های حاد تنفسی، به تفکیک دانشگاه های علوم پزشکی و بر اساس داده های نظام مراقبت روتین/غیردیده وری نشان می دهد. رنگ بندی این نقشه ها بیانگر شدت نسبی گردش ویروس در مناطق مختلف کشور در هفته های مورد نظر می باشد. همانگونه که در تصویر مشاهده می شود به روزرسانی هفتگی نقشه، امکان پایش روند تغییرات منطقه ای و شناسایی کانون های افزایش فعالیت آنفلوانزا را فراهم می کند و می تواند به عنوان ابزاری پشتیبان برای تصمیم گیری مدیریتی، هدف گذاری مداخلات بهداشتی و اطلاع رسانی مبتنی بر شواهد مورد استفاده قرار گیرد؛ با این حال، ضرورت دارد این تغییرات هفتگی با احتیاط تفسیر شوند، زیرا داده های نظام های مراقبت غیردیده وری همواره تحت تأثیر دسترسی به تست و تصمیم پزشکان برای انجام آزمایش است.



روند زیرسویه های در گردش ویروس کووید-۱۹ در کشور طی ماه های خرداد لغایت آبان ۱۴۰۴



دانشگاه ها و مراکز همکار دیده وری

