

# آسیت

## علائم آسیت چیست؟

آسیت بیمارانی که دچار آسیت می‌شوند، متوجه اتساع شکم و افزایش سریع وزن می‌شوند. آسیت می‌تواند خوردن، آشامیدن و حرکت کردن و جابجایی را با مشکل روبرو کند.

همچنین می‌تواند با تجمع مایع اطراف ریه‌ها نفس کشیدن را سخت کند. عوارض مرتبط با آسیت عبارتند از:

احساس ناراحتی و درد شکم عفونت

فتق مربوط به آسیت

تجمع مایعات در قفسه سینه

سندروم هپاتورزال: نوع نادری از نارسایی پیشرونده کلیه است که به دلیل آسیت رخ می‌دهد.

### عوامل خطر شایع در آسیت عبارتند از:

- عفونت‌های ویروسی مانند هپاتیت C یا هپاتیت B
- سوءصرف الکل
- سرطان در ارگان‌های ناحیه شکم
- نارسایی کلیه
- نارسایی احتقانی قلب



## عوارض بیماری آسیت کدامند؟

اكثر بیمارانی که دچار آسیت می‌شوند، متوجه اتساع شکم و افزایش سریع وزن می‌شوند. آسیت می‌تواند خوردن، آشامیدن و حرکت کردن و جابجایی را با مشکل روبرو کند.

همچنین می‌تواند با تجمع مایع اطراف ریه‌ها نفس کشیدن را سخت کند. عوارض مرتبط با آسیت عبارتند از:

- احساس پری و از دست دادن اشتها
  - سوزش سرد
  - احساس سنگینی
  - تورم در اندام تحتانی
  - استفراغ
  - بواسیر
  - فتق
  - تب
- اگر ترکیبی از این علائم دارید، به پزشک مراجعه کنید.

## چه عواملی باعث ایجاد آسیت می‌شوند؟

شایعترین علت آسیت سیروز کبدی است. نوشیدن بیش از حد الکل یکی از مهم‌ترین دلایل سیروز کبدی است. آسیت به دلیل ترکیبی از فشار افزایش یافته در وریدهایی که از طریق کبد عبور می‌کنند (فشار خون بالا پورتال) و کاهش عملکرد کبد ناشی از زخم شدن کبد، یعنی سیروز، ایجاد می‌شود.

انواع مختلف سرطان نیز می‌تواند باعث این وضعیت شود. آسیت ناشی از سرطان اغلب با سرطان پیشرفته یا عودکننده اتفاق می‌افتد. همچنین ممکن است آسیت به دلیل مشکلات دیگری مانند نارسایی قلبی، دیالیز به دلیل نارسایی کلیه، پروتئین پایین خون و عفونت ایجاد شود.



آسیت نوعی بیماری است که در آن مایعات در فضای داخل شکم جمع می‌شود. هنگامی که بیش از ۲۵ میلی لیتر مایع در داخل حفره شکم جمع شود، به عنوان آسیت شناخته می‌شود. آسیت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که کبد به درستی کار نکند؛ در این حالت مایعات فضای بین پوشش شکم و اعضاء را پر می‌کند.

اگر شدید باشد، آسیت ممکن است دردناک باشد. این مشکل ممکن است شما را از حرکت راحت باز دارد. آسیت می‌تواند زمینه را برای ایجاد عفونت در شکم فراهم کند. مایعات همچنین ممکن است به درون قفسه سینه حرکت کرده و ریه‌ها را احاطه کند؛ این شرایط باعث تنگی نفس می‌شود.

## آیا می‌توان از آسیت جلوگیری کرد؟

نمی‌توان از ایجاد آسیت جلوگیری کرد. با این حال، با محافظت از کبد می‌توان خطر ابتلاء به آسیت را کاهش داد. با ایجاد تغییرات خاصی در سبک زندگی می‌توان از ابتلاء به سیروز کبدی و سرطان جلوگیری کرد؛ که در نتیجه آن از بروز آسیت نیز جلوگیری می‌شود. این اقدامات شامل موارد زیر است:

- قطع مصرف الكل یا مصرف محدود آن
- نگه داشتن وزن در محدوده طبیعی
- ورزش منظم
- عدم استعمال دخانیات
- محدود کردن نمک در رژیم غذایی
- عدم استفاده از مواد روانگردان
- واکسیناسیون در مقابل ویروس هپاتیت B

## چه زمانی لازم است با پزشک تماس بگیرید؟

علائم آسیت بسته به علت تجمع مایع می‌تواند به آرامی یا ناگهانی ظاهر شود. علائم همیشه یک وضعیت اضطراری را نشان نمی‌دهد، اما اگر موارد زیر را تجربه کردید "حتماً" با پزشک خود در میان بگذارید:

- شکم متسع یا متورم
- افزایش وزن ناگهانی
- مشکل در تنفس هنگام خوابیدن
- کاهش اشتها
- درد شکم
- نفخ شکم
- تهوع و استفراغ
- سوزش سردد

منبع :

Brunner & Suddarths Textbook  
of medical surgical Nursing  
2018

سازمان بهار نجف داخلی سال ۱۴۰۱

## رژیم غذایی

مهم ترین مرحله برای درمان آسیت کاهش دقیق مصرف نمک است. مصرف نمک لازم است به ۵-۶ گرم در روز یا کمتر محدود شود

وصیه می‌شود بیمار مبتلا به آسیت به یک متخصص تغذیه (رژیم درمانی) مراجعه کند

نمک انتخابی حتماً باید بدون پتابسیم باشد؛ زیرا داروهایی که برای درمان آسیت تجویز می‌شود سطح پتابسیم خونرا افزایش میدهد

## داروها

در بیشتر مواقع، بیماران برای درمان آسیت خود به قرص‌های دیورتیک (ادرار آور) احتیاج دارند. این داروها میزان نمک و آب خارج شده به دنبال آن را، از بدن را افزایش داده و از این طریق باعث کاهش فشار داخل وریدهای اطراف کبد می‌شوند.

## پارا سنتر


هنگامی که تجمع مایعات با قرص‌های دیورتیک و رژیم غذایی با محدودیت نمک قابل درمان نباشد، ممکن است لازم باشد برای تسکین علائم بیمار از روش پارا سنتر (paracentesis) استفاده شود. در این روش، بعد از بی‌حسی موضعی از یک سوزن نازک و بلند برای تخلیه مایعات اضافی شکم استفاده می‌شود. سوزن از طریق پوست و به داخل حفره شکم وارد می‌شود.



## چگونه آسیت تشخیص داده می‌شود؟

بسته به میزان مایع موجود در شکم، ممکن است در معاینه بدنی توسط پزشک تشخیص داده شود اما معمولاً با انجام آزمایشاتی مانند سونوگرافی یا سی تی اسکن شکم، وجود آسیت تأیید می‌شود. در اکثر بیماران، پزشک توصیه می‌کند که آزمایش پارا سنتر انجام شود؛

۷۵ این آزمایش پس از بی‌حسی موضعی، یک سوزن کوچک از دیواره شکم رد شده و پس از خارج کردن مایعات، جهت بررسی به آزمایشگاه ارسال می‌شود. مایعات برداشته شده از نظر وجود علائم عفونت یا سرطان و تعیین علت تجمع مایعات مورد بررسی قرار می‌گیرند.



## چگونه آسیت درمان می‌شود؟

انجام بعضی اقدامات ساده می‌تواند به کاهش علائم آسیت کمک کند. پزشک ممکن است توصیه‌های زیر را به شما بکند: مصرف نمک خود را کاهش دهید.

• مقدار مایعاتی که می‌نوشید را کاهش دهید.  
• مصرف الكل را متوقف کنید.

بررسی روزانه وزن بدن با ترازو و تماس با پزشک هر زمان که بیشتر از ۵ کیلو افزایش وزن (یا بیشتر از یک کیلو در روز به مدت ۳ روز متوالی) داشته باشید،