

ختم بارداری

در صورت بروز فشار خون بالا و یا عوارض دیگر مادر در بیمارستان بستری شود و با توجه به شرایط مادر و جنین بارداری ختم می‌شود.

در صورتی که بارداری بدون مشکل و کنترل قند خون با تغذیه تا هفته ۴۰ بارداری،

در صورت بارداری بدون مشکل و کنترل قند خون با دارو، ختم بارداری در هفته ۳۹ می‌باشد و بارداری با قند خون کنترل نشده با دارو، هفته ۳۸ بارداری ختم بارداری داده می‌شود.

رزیم غذایی دیابتی در بیماران:

✓ به جای سرخ کردن موادغذایی، از روش کباب کردن، آب پز و بخارپز استفاده شود.

✓ چربی گوشت و پوست مرغ قبل از طبخ جدا شود.

- ✓ سبزی و میوه‌هایی که شیرینی کمتری دارند، بیشتر استفاده شود.
- ✓ مواد نشاسته دار مانند سیب زمینی، نان و برنج کمتر مصرف شود و بیشتر از نان‌های تیره و سبوس دار استفاده شود.
- ✓ به جای مصرف برنج ساده، بیشتر از غذاهایی مانند لوبیا پلو، عدس یا کلم پلو به همراه سالاد استفاده شود.
- ✓ از خورشت‌هایی مانند خورشت کرفس، سبزی یا کدو و یا بادمجان آب پز مصرف شود.
- ✓ صباحانه حتماً در برنامه غذایی روزانه باشد و از لبنیات مانند پنیر، ماست و شیر در روز مصرف شود.
- ✓ در صورت بی اشتهایی، تعداد وعده‌ها زیاد و حجم غذا در هر وعده کم شود.
- ✓ از خوردن آب میوه‌شیرین، خربزه، طالبی، گرمک و... پرهیز شود.

به نام خالق هستی بخش

عنوان:

دیابت بارداری

تهیه کننده: خدیجه اسماعیلی

منبع: کتاب ویلیامز/ راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان (بازنگری سوم)

تاریخ تهیه: ۱۴۰۱

تاریخ آخرین بازنگری: -



دیابت آشکار یا پیش از بارداری: قبل از بارداری، فرد به آن مبتلا است و با شروع بارداری تشخیص داده شده است.

دیابت حاملگی: تشخیص دیابت در طی حاملگی که معمولاً در هفته ۲۴_۲۸ بارداری تشخیص داده می‌شود. این نوع دیابت معمولاً در نیمه دوم بارداری تحت تأثیر هورمون‌های جفتی به وجود می‌آید. هرچه دیابت در سن بارداری کمتر شناسایی شود، احتمال اینکه مادر از قبل دیابت داشته است و دیابت بعد از بارداری برای او ماندگار باشد، بالاتر خواهد بود.

دیابت حاملگی نوع ۱: گلوکز پلاسمای ناشتا زیر ۹۳ میلی گرم در دسی لیتر و گلوکز ۲ ساعت بعد از غذا بیش از ۱۲۰ میلی گرم در دسی لیتر است. در مراقبت‌های بارداری همانند دیابت آشکار برخورد می‌شود. درمان با انسولین توصیه می‌شود.

مراقبت‌های قبل از بارداری در مادر مبتلا به دیابت آشکار:

- کنترل قندخون و اجازه بارداری حداقل ۳ ماه بعد از طبیعی شدن قند و انجام آزمایش HbA1 C (کمتر از ۶ درصد)
- ادامه داروهای کاهنده قند خون
- تاکید بر مصرف اسید فولیک
- مشاوره چشم پزشکی و بررسی تیروئید و کلیه و قلب در تمام بیماران مبتلا به دیابت و دارای علائم بالینی

مراقبت‌های بارداری:

- هر روز قند خون در چهار نوبت با گلوکومتر اندازه گیری شود. (صبح ناشتا، ۲ ساعت بعد از صبحانه، ۲ ساعت بعد از ناهار، ۲ ساعت بعد از شام)
- لازم است هر ۲_۳ هفته یکبار در آزمایشگاه با خون وریدی قند خون کنترل شود.