



پنومونی در اطفال



تهیه و تنظیم:

امیرحسین بغیری محمادمین سامقانی

بخش اطفال

منابع:

برونر و سودارت (داخلی - جراحی) 1397 - کتاب مرجع پرستاری
بیماریها، راههای شناخت و درمان و پیشگیری از آن

مقدمه:

پنومونی التهاب پارانشیم ریه است که در دوران
کودکی شایع تر است. عامل ایجاد کننده پنومونی
می تواند باکتری، ویروس یا ورود مواد خارجی (غذا،
آب...) به داخل ریه باشد.

همه گیری پنومونی در فصل پاییز و زمستان می
باشد.

علائم پنومونی:

شروع علائم در ابتدا شامل آب ریزش بینی و سرفه
می باشد: تهوع، استفراغ، اسهال، دل درد، تحریک
پذیری، بی قراری، تورفتگی عضلات بین دنده ای
قفسه سینه، تنفس های سطحی و سریع، حرکت
جدارهای بینی و ... می باشد.

تنفس تند در کودکان به معنای:

در کودک کمتر از 2 ماه: 60 بار در دقیقه و بیشتر

در کودک 2-12 ماهه: 50 بار در دقیقه و بیشتر

در کودک 12 ماهه تا 5 ساله: 40 بار در دقیقه و بیشتر

بالای 5 سال: 30 بار در دقیقه و بیشتر

علائم خطر:

در صورت مشاهده هر کدام از علائم، سریعاً به

پزشک مراجعه نمایید:

1. کودک کمتر از 2 ماه: کاهش قدرت مکیدن -
تشنج در چند روز اخیر - استفراغ مکرر - تنفس تند
(60 بار در دقیقه یا بیشتر) - باز و بسته شدن (پرش) پره
های بینی هنگام تنفس - خاله کردن هنگام بازدم - بی
حالی و کاهش سطح هوشیاری - تحرک کمتر از معمول
- برآمدگی ملاحظ - دمای بدن بیش از 37 درجه و کمتر
از 36 درجه - رنگ پریدگی شدید - سیانوز

2. کودک 2 ماه تا 5 سال: عدم توانایی در نوشیدن
یا شیرخوردن - تشنج در چند روز اخیر - استفراغ
مکرر - خواب آلودگی غیر عادی یا عدم هوشیاری
تنفس سریع و تند - حرور غرقه قفسه سینه

3. موارد بستری در پنومونی اطفال: سن کمتر

از 6 ماه - نقص سیستم ایمنی - حال عمومی بد -

دیسترسی شدید تنفسی - نیاز به اکسیژن - کم آبی -

استفراغ - عدم پاسخ به آنتی بیوتیک خوراکی