



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره: ۳۰۴/۳۱۱۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

پیوست: ندارد

«سرمایه گذاری برای تولید»
(مقام معظم رهبری)

معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی...

موضوع: پروتکل توصیه شده توسط کمیته فنی کشوری سل

با سلام و احترام

از آنجائیکه در حال حاضر با کمبود کشوری داروی ایزونیازید ۳۰۰ مواجه هستیم، خواهشمند است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی، طبق پروتکل توصیه شده از سوی کمیته فنی کشوری سل (به شرح زیر) اقدام گردد:

گروه هدف	وضعیت دریافت درمان پیشگیری	طول مدت دریافت درمان پیشگیری	اقدام تا زمان رفع کمبود دارو
افراد در تماس نزدیک بیمار مبتلا به سل ریوی دارای اندیکاسیون دریافت درمان پیشگیری (گروه سنی بالاتر از ۵ سال)	تحت درمان پیشگیری با ایزونیازید به تنهایی	بیش از ۴ ماه	درمان پیشگیری خاتمه یابد.
	درمان پیشگیری هنوز شروع نشده است	کمتر از ۴ ماه	درمان پیشگیری به مدت سه ماه با داروی دو ترکیبی (ایزونیازید+ ریفامپین) ادامه یابد.
		-	درمان پیشگیری به بعد از تامین دارو موقوف شود.
کودکان زیر ۵ سال در تماس نزدیک با بیمار مبتلا به سل ریوی	همچنان مطابق راهنمای کشوری سل (با ایزونیازید ۱۰۰) تحت درمان پیشگیری قرار گیرند.		
افراد دارای نقص سیستم ایمنی (نظیر افراد HIV مثبت، دریافت کننده داروهای Anti-TNF و افراد کاندید/دریافت کننده پیوند) دارای اندیکاسیون دریافت درمان پیشگیری	درمان پیشگیری به مدت سه ماه با داروی دو ترکیبی (ایزونیازید+ ریفامپین) تجویز شود.		

لازم به ذکر است تا زمان رفع کمبود داروی مذکور، برای بزرگسالان مبتلا به سل فعالی که به دلیل عارضه هپاتیت دارویی نیازمند مدیریت بالینی عوارض با استفاده از تجویز تدریجی داروهای منفرد هستند، رژیم دارویی "2FDC + Ethambutol" توصیه می شود؛ و در این حالت شروع مجدد داروهای ضد سل با استفاده از قرص دو ترکیبی با مقادیر پایین و سپس افزایش تدریجی آن خواهد بود.

دکتر قباد مرادی
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای
واگیر