

جراحی برداشتن سنگ کیسه صفرا که به عنوان کوله سیستکتومی نیز شناخته می شود، یک روش بسیار رایج برای درمان درد کیسه صفرا است که از سنگ پر شده است. کیسه صفرا اندامی کوچک و کیسه مانند است که در قسمت بالایی سمت راست شکم قرار دارد. صفرا که توسط کبد ساخته شده و تجزیه غذاهای چرب را برعهده دارد، در کیسه صفرا ذخیره می شود. شما می توانید بدون کیسه صفرا به زندگی ادامه دهید، بنابراین در صورت بروز مشکل، پزشک می تواند کیسه صفرا را بردارد.




•آماده کردن بیمار:

بررسی عوارض احتمالی سنگ صفرا در تمام بیماران باید سونوگرافی کبد و مجاری صفراوی که در شش ماه اخیر انجام شده باشد داشته باشیم بخصوص جهت بررسی اتساع و سنگ احتمالی در مجاری صفراوی.


در این رابطه تستهای کبدی نیز که در ۱-۲ ماه اخیر انجام شده باشد لازم است.

اگر تغییر در علائم بیمار ایجاد شده باشد تکرار سونوگرافی و آزمایشات پس از این تغییرات نیز لازم است. اگر این بررسی ها مشکوک بود ممکن است که بررسیهای بیشتر مثل MRCP یا ERCP انجام شود.



•آمادگی روز عمل

مانند هر بیماری که تحت بیهوشی عمومی قرار می گیرد لازم است از حدود ۸ ساعت قبل از بیهوشی، از مصرف غذاهای جامد پرهیز نماید. در بیماران که در موضع عمل موهای بلند داشته باشند لازم است که موها کوتاه شوند. سونداژ ادراری و لوله معده قبل از عمل نیاز نیست.



•مراقبتهای بعد از عمل

اکثر بیماران ۶ ساعت پس از عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپی، میتوانند نوشیدن مایعات را شروع نمایند. بعضی بیماران ممکن




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

کد سند: BH.adu.pam.04

کله سیستگتومی

(برداشتن کیسه صفرا)



تهیه و تنظیم: دفتر آموزش سلامت

بازنگری بهار ۱۴۰۵

منبع: درسنامه داخلی و جراحی برونر

و ثودرات ۲۰۲۲

می شوند و در همین حدود هم بیمار کار روزانه اش را شروع می کند. بهتر است چند هفته اول را از کار بدنی سنگین پرهیز نماید.

پس از ترخیص در صورتی که بیمار درد شدید شکم، تهوع و استفراغ، تب، ضعف و بیحالی یا بی اشتها یا شدید پیدا کرد باید به پزشک معالج خود مراجعه نماید.

است تهوع و استفراغ داشته باشند که با مصرف داروهای ضد تهوع برطرف می شود.

در یک هفته اول پس از عمل از مصرف غذاهای سنگین و نفاخ پرهیز شود ولی پس از آن محدودیتی برای غذا ندارند.

اکثر بیماران قادر هستند که از تخت خارج شوند و توصیه می شود از این زمان به بعد، بیمار هر چه بیشتر راه برود.

در صورتی که برای بیمار درن گذاشته شده باشد، معمولاً روز پس از عمل خارج می شود. خارج کردن درن بسته به رنگ و نوع ترشح و مقدار آن است که با قضاوت جراح انجام می شود. ممکن است درن پس از ترخیص و بطور سرپایی خارج شود.

ترخیص بیمار بسته به شرایط، از ۶ ساعت تا چند روز پس از عمل است.

بیمار بسته به نوع بخیه و پانسمان از عصر روز عمل یا روز دوم بعد از عمل می تواند استحمام نماید.

بخیه ها معمولاً یک هفته پس از عمل کشیده

بیمارستان بهار

شماره تماس: ۰۸۲۴۰۳۲۲۴