حاملگی خارج از رحم چیست؟

تشکیل جنین در نقطه ای غیر از رحم مادر,از جمله لوله های رحمی,تخمدان,گردن رحم و یا حتی حفره شکم را گویند.

خطرات ناشی از حاملگی خارج رحمی برای جان مادر از خطر حاملگی های معمولی یا حتی حاملگی هایی که منجر به سقط جنین می شود بیشتر است .بنابراین تشخیص زودرس این نوع حاملگی میزان بقای مادرواحتمال حفظ قدرت باروری وی را افزایش میدهد.

تشخیص به موقع و انتخاب درمان مناسب،کلید جلوگیری از عوارض،حفظ باروری،کاهش هزینه ها و جلوگیری از مرگ و میر است.

علل حاملگی خارج رحمی:

*سابقه حاملگی نابجای قبلی

*سابقه جراحی بر روی لوله های رحم

*مواجه قبل از زایمان با دی اتیل استرون

*سیگارکشیدن

*وسایل داخل رحمی(آیودی)

*سابقه عفونت های ناحیه تناسلی

*افرادی با داشتن بیشتر از یک شریک جنسی

*بستن لوله

*ناباروری

*عمل جراحی لگنی و شکمی قبلی



علایم و نشانه ها

۱-لکه بینی یا خونریزی واژینال در عین مثبت بودن تست حاملگی

۲-درد و دل پیچه قسمت پایین شکم

۳-درد لگنی

۴-درد در قسمت شانه

۵-غش وشوک(رنگ پریدگی ،تند شدن ضربان قلب،پایین افتادن فشار و عرق سرد) که دو مورد آخر در صورت پارگی لوله رحمی اتفاق می افتد .

حاملگی نا بجا یا خارج رحمی از مهمترین شرایط اورژانسی در بارداری محسوب می شود که تشخیص هر جه سریعتر آن موجب نجات جان مادر و حفظ باروری مجدد وی میگردد.

درمان:

اگر بارداری خارج رحمی در مراحل اولیه تشخیص داده شود میتوان با مصرف دارو نطفه را جذب کرد اما در مراحل پیشرفته بارداری،انجام جراحی روش مناسبتری است.به طور کلی وضعیت مزبور اورژانس محسوب میشود و فرد باید فورا تحت درمان قرار گیرد . اما با تشخیص زود هنگام و انجام عمل جراحی احتمال بهبودی

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بهارستان بهارستان شاهرود

کامل زیاد است. تا جایی که دیده شده است در ۵۰ تا ۸۵ درصد از بیماران حاملگی های بعدی طبیعی هستند.

مراقبت های لازم بعد از عمل

♦ ۷ تا ۱۰ روز بعد از عمل جهت کشیدن بخیه ها به مرکز درمانی مراجعه نمایید .

♦جهت دریافت جواب نمونه پاتولوزی با در دست داشتن برگه بیست روز بعد به آزمایشگاه مراجعه نماید.

♦جهت ادامه درمان با در دست داشتن جواب پاتولوژی به مرکز درمانی مراجعه نماید .

♦تا زمان ترمیم کامل ناحیه عمل باید از مقاربت خودداری نماید.(معمولا تا ۴۰ روز)

♦از انجام کار های سنگین ،بلند کردن و هل دادن اجسام سنگین تا بهبودی کامل (معمولا ۶ هفته) خودداری نمایید.

.


♦چنانچه از بیهوشی عمومی استفاده تموده اید بعد از عمل نفس های عمیق بکشید و سرفه کنید .البته در هنگام سرفه کردن دست خود را بر ناحیه عمل بگذارید تا از فشار آمدن به ناحیه عمل خودداری شود.ضمنا این روش به شما کمک میکند داروههای بیهوشی سریعتر از بدن خارج شود

بیمارستان بهار

شماره تماس : ۳۲۲۴۰۸۲۴

کد سند:BH.adu.pam.05.42

حاملگی خارج از رحم



تهیه و تنظیم : دفتر آموزش سلامت

بازنگری بهار۱۴۰۵

منبع : بارداری وزایمان ویلیامز جلد ۲ دکتر بهرام قاضی جهانی

مرکز آموزش پژوهشی و درمانی بیمارستان بهار شاهرود