فاویسم چیست؟

والدین گرامی: کودک شما مبتلا به بیماری فاویسم است که علت آن نقص یا کمبود آنزیمی در گلبول قرمز بنام G6PDمیباشد. این بیماری بدنبال مصرف باقلا، بعضی از داروها و یا ابتلا به بعضی از عفونتها ایجاد میشود.

علائم تخصصی: زردی،تغییر رنگ ادرار به صورت پررنگ و رنگ چای در موارد پیشرفته،کاهش سطح هوشیاری و افت فشار خون

علائم بیماری در دوره نوزادی خود را به صورت زردی دوره نوزادی نشان می دهد.بنابراین تمام نوزادان مبتلا به زردی در این مرکز از لحاظ بیماری بررسی می شوند.

هم چنین در بسیاری از موارد ،زردی این نوزادان پس از درمان و ترخیص از بیمارستان مجددا بالا می رود،به همین منظور پس از بهبودی این نوزادان پیگیری جهت چک مجدد آزمایش زردی و مراجعه به پزشک توصیه می شود.به یاد داشته باشید عفونت ها از مواردی هستند که می توانند باعث تشدید همولیز و تاثیر منفی بیشتر مواد اکسیدان شوند.



شدت علائم ایجاد شده به شدت بیماری (میزان کمبود آنزیم)و شرایط بیمار (عفونت های اخیر) و مقدار و مدت مواجهه شدن با ماده حساسیت زا بستگی دارد.

مواد اکسیدان که باعث همولیز می شوند چه موادی هستند؟

- **باقلا**


شایع ترین ماده خوراکی که باعث بروز علائم در فرد می شود "باقلا" است .حتی دیده شده با خوردن مقدار کم ،ممکن است فرد را دچار مشکل کند.

- **مواد شیمیایی**

عدم استفاده فرد از حنا

- **بروز عفونت:**

بدون مصرف باقلا یا داروی خاصی و بدون تماس با مواد شیمیایی در صورت عفونت فرد فاویسمی می تواند دچار علائم بیماری شود.



مادر عزیز:"اگر به کودک فاویسمی خود شیر میدهید شما هم باید از مصرف باقلا و آسپرین خودداری کنید ."

درمان: این بیماری درمان قطعی ندارد و تنها اقدام پرهیز از مواجهه با عوامل خطر است.

لیست داروهایی که در مبتلایان به فاویسم نباید استفاده شود و حتما با نظر پزشک باشد:

آسپرین با دوز بالا،ویتامین K،کلرامفنیکل،کوتریموکسازول،

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان بهار شاهرود

کد سند:BH.adu.pam.05.36

فاویسم



تهیه و تنظیم : دفتر آموزش سلامت

بازنگری بهار۱۴۰۵

منبع : درسنامه جامع پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

نویسنده:میترا ذوالفقاریان

سولفامتوکسازول،نالیدیکسیک اسید،نیتروفورانتوئین،متیلن بلو،داپسون،سیپروفلوکساسین،پریماکین، اوفلوکساسین ،فنازوپریدین،گلی بن کلامید،کنیدین،کلروکین،منادیون سدیم،سولفادیازین،سولفونیل اوره، تولونیوم کلرید،پاماکین،تافنوکین،موکسی فلوکساسین،نورفلوکساسین،مپاکرین،دی مرکاپتوسوکسینیک اسید

توجه و توصیه:

- در حالت عادی رعایت اقدامات پیشگیرانه و پیشگیری از مواجهه با مواد اکسیدان
- مراجعه به پزشک و انجام آزمایش برای بررسی سایر فرزندان
- یادآوری به پزشک در هنگام هرگونه مراجعه پزشکی
- با بروز کوچک ترین علامت مشکوک از جمله تغییر رنگ ادرار،بروز زردی،بیحالی مراجعه سریع به پزشک صورت گیرد.
- پرهیز از مواجهه به معنی نخوردن باقلا به تنهایی نیست.گاهی دیده می شود که حتی عبور از کنار مزرعه
- باقلا و یا حضور در خانه ای که باقلا پاک شده ،باعث بروز علائم در فرد مبتلا می شود.
- برای تسکین درد یا پایین آوردن تب از استامینوفن فقط با مقداری که پزشک تجویز کرده ،انجام شود.
- در مورد نوزادان مبتلا به فاویسم که دچار زردی می شوند،استفاده خوراکی یا حتی شست و شوی بدن نوزاد با داروی گیاهی ،عرقیات و هم چنین استفاده مادر شیرده از این مواد ممنوع است.چون ممکن است علائم بسیار خطرناک تر هم بروز کند

بیمارستان بهار

شماره تماس : ۳۲۲۴۰۸۲۴

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیمارستان بهار شاهرود