

پرسی های متداول: " ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری " کد: ۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۲

سوال یک: واکسیناسیون کودکان زیر شش سال به چه منظور الزامیست؟

ارتقاء پوشش های واکسیناسیون، دستاوردهای مهمی از جمله ریشه کنی بیماری فلج اطفال و حذف ویروس های سرخک و سرخجه و حذف کزاز نوزادی را در کشور به همراه داشته است. همچنین باعث کنترل بیماریهای سل - دیفتری - سیاه سرفه - هموفیلوس آنفلوآنزا و هپاتیت گردیده است.

سوال دو: مشخصات عارضه واکسن های روتین کودکان کدامند؟

آبسه در محل تزریق - ندول - لنفادنیت - عارضه موضعی شدید (تورم فراتر از مفصل که بیش از سه روز ادامه یابد یا منجر به بستری شود) - فلج (۳۰ روز بعد از واکسیناسیون) - تشنج - تب بالا (۳۸/۵ درجه سانتیگراد و بیشتر زیر بغلی) - کاهش سطح هوشیاری - بثورات جلدی ماکولوپاپولر - جیغ زدن مداوم یا بی قراری - شوک/غش - اسهال - التهاب و درد مفاصل - استفراغ - تنگی نفس - واکنش های حساسیتی (کهیر یا گزما، تنگی نفس، تورم صورت یا کل بدن) - حملات هیپوتونیک (HHE) (رنگ پریدگی ناگهانی، کاهش پاسخ به تحریکات، کاهش تون عضلانی ۲۴ ساعت پس از تزریق) - شوک توکسیک (شروع ناگهانی تب، استفراغ و اسهال شدید آبکی چند ساعت پس از واکسن) - شوک آنافیلاکسی (بلافاصله پس از تزریق با برونکواسپاسم، تنگی نفس و اختلال در گردش خون) - عفونت ب ت ژ منتشر (یک تا ۱۲ ماه بعد از دریافت ب ت ژ)

سوال سه: با مشاهده هر کدام از موارد بالا چه باید کرد؟

به نزدیک ترین مرکز جامع خدمات سلامت، پایگاه سلامت و یا خانه بهداشت مراجعه نمایید تا مراقبین سلامت با بررسی عارضه، مراقبت های لازم را به شما ارائه دهند

سوال چهار: فرآیند گزارش دهی و مراقبت عارضه واکسن های روتین کودکان کدام است؟

- بعد از مراجعه مادر به مرکز جامع خدمات سلامت، پایگاه سلامت و یا خانه بهداشت، نوع عارضه توسط مراقب سلامت و در صورت نیاز توسط پزشک بررسی می شود.
- سپس فرم شماره دو (فرم انفرادی گزارش دهی عوارض ناشی از واکسیناسیون) توسط مراقب سلامت پر شده و جهت ثبت در پورتال وزارتخانه به کارشناس ستاد معاونت بهداشتی ارسال می گردد .
- مراقبت های لازم و پیگیری برای عارضه واکسن توسط تیم بهداشتی (مراقب سلامت و پزشک مرکز) تا حصول بهبودی کودک صورت می گیرد